arXiv:math/0304232v1 [math.NT] 16 Apr 2003

ICM 2002 · Vol. III · 1–3

Analyse p-adique et Représentations Galoisiennes

Jean-Marc Fontaine*

Abstract

The notion of a p-adic de Rham representation of the absolute Galois group of a p-adic field was introduced about twenty years ago (see e.g. [Fo93]). Three important results for this theory have been obtained recently: The structure theorem for the *almost* C_p*-representations*, the theorem *weakly admissible implies admissible* and the theorem *de Rham implies potentially semi-stable*. The proofs of the first two theorems are closely related to the study of a new kind of analytic groups, the *Banach-Colmez spaces* and the proof of the third uses deep results on *p-adic differential equations on the Robba ring*.

2000 Mathematics Subject Classification: 11F80, 11S25, 12H25, 14G22.
Keywords and Phrases: Galois representations, de Rham representations, Semi-stable representations, p-adic Banach spaces, p-adic differential equations.

1. Représentations p-adiques

1.1. – Dans tout ce qui suit, K est un corps de caractéristique 0, complet pour une valuation discrète, à corps résiduel k parfait de caractéristique $p > 0$. On choisit une clôture algébrique $\overline{K}$ de K, on note C son complété et $|\ |_p$ la valeur absolue de C normalisée par $|p|_p = p^{-1}$. On pose $G_K = \mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$.

Une représentation banachique (*de* G_K) est un espace de Banach p-adique muni d'une action linéaire et continue de G_K. Avec comme morphismes les applications $\mathbb{Q}_p$-linéaires continues G_K-équivariantes, ces représentations forment une catégorie additive $\mathbb{Q}_p$-linéaire $\mathcal{B}(G_K)$.

Une C*-représentation* (*de* G_K) est un C-espace vectoriel de dimension finie muni d'une action semi-linéaire et continue de G_K. Lorsque k est fini, la catégorie $\mathrm{Rep}_C(G_K)$ des C-représentations s'identifie à une sous-catégorie pleine de $\mathcal{B}(G_K)$:

* Institut Universitaire de France et UMR 8628 du CNRS, Mathématique, Université de Paris-Sud, Bâtiment 425, 91405 ORSAY Cedex, France. E-mail: fontaine@math.u-psud.fr

Proposition [Fo00]. — *Supposons k fini. Si W_1 et W_2 sont des C-représentations, toute application $\mathbb{Q}_p$-linéaire continue G_K-équivariante de W_1 dans W_2 est C-linéaire.*

Disons que deux représentations banachiques S_1 et S_2 sont *presque isomorphes* s'il existe un triplet (V_1, V_2, α) où V_i est un sous-$\mathbb{Q}_p$-espace vectoriel de dimension finie de S_i, stable par G_K, et où $\alpha : S_1/V_1 \to S_2/V_2$ est un isomorphisme (dans $\mathcal{B}(G_K)$). Une *presque-C-représentation* $($*de* $G_K)$ est une représentation banachique qui est presque isomorphe à une C-représentation. On note $\mathcal{C}(G_K)$ la sous-catégorie pleine de $\mathcal{B}(G_K)$ dont les objets sont les presque-C-représentations. Elle contient la catégorie $\mathrm{Rep}_C(G_K)$ et la catégorie $\mathrm{Rep}_{\mathbb{Q}_p}(G_K)$ des *représentations p-adiques de dimension finie* $($*de* $G_K)$ comme sous-catégories pleines.

Théorème A [Fo02]. — *Supposons k fini. La catégorie $\mathcal{C}(G_K)$ est abélienne. Il existe sur les objets de $\mathcal{C}(G_K)$ une unique fonction additive $dh : S \mapsto (d(S), h(S)) \in \mathbb{N} \times \mathbb{Z}$ telle que $dh(W) = (\dim_C W, 0)$ si W est une C-représentation et $dh(V) = (0, \dim_{\mathbb{Q}_p} V)$ si V est de dimension finie sur $\mathbb{Q}_p$.*

Si S et T sont des objets de $\mathcal{C}(G_K)$, les $\mathbb{Q}_p$-espaces vectoriels $\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{C}(G_K)}(S,T)$ sont de dimension finie et sont nuls pour $i \notin \{0,1,2\}$. On a

$$\textstyle\sum_{i=0}^{2}(-1)^i \dim_{\mathbb{Q}_p} \mathrm{Ext}^i_{\mathcal{C}(G_K)}(S,T) = -[K:\mathbb{Q}_p]h(S)h(T).$$

1.2. – Soit [(1)] FR l'ensemble des suites $(x^{(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de C vérifiant $(x^{(n+1)})^p = x^{(n)}$ pour tout n. Avec les lois

$$(x+y)^{(n)} = \lim_{m\mapsto\infty}(x^{(n+m)} + y^{(n+m)})^{p^m} \text{ et } (xy)^{(n)} = x^{(n)}y^{(n)}$$

c'est un corps algébriquement clos de caractéristique p, complet pour la valeur absolue définie par $|x| = |x^{(0)}|_p$ et on note R l'anneau de la valuation. Son corps résiduel s'identifie au corps résiduel $\overline{k}$ de $\overline{K}$. L'anneau $W(R)$ des vecteurs de Witt à coefficients dans R est intègre. Choisissons $\varepsilon, \pi \in R$ vérifiant $\varepsilon^{(0)} = 1$, $\varepsilon^{(1)} \neq 1$ et $\pi^{(0)} = p$ et, pour tout $a \in R$ notons $[a] = (a, 0, 0, \ldots)$ son représentant de Teichmüller dans $W(R)$. L'application $\theta : W(R) \to \mathcal{O}_C$ qui envoie $(a_0, a_1, \ldots)$ sur $\sum_{n\in\mathbb{N}} p^n a_n^{(n)}$ est un homomorphisme d'anneaux surjectif dont le noyau est l'idéal principal engendré par $\xi = [\pi] - p$. On note encore $\theta : W(R)[1/p] \to C$ l'application déduite en rendant p inversible. Rappelons que $B_{dR}^+ = \varprojlim_{n\in\mathbb{N}} W(R)[1/p]/(\xi^n)$ et que le corps B_{dR} des périodes p-adiques est le corps des fractions de B_{dR}^+. Toute unité a de R s'écrit d'une manière unique sous la forme $a = a_0 a^+$ avec $a_0 \in \bar{k}$ et $|a^+ - 1| < 1$, la série $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n+1}([a^+]-1)^n/n$ converge dans B_{dR}^+ vers un élément noté $\log[a]$; on pose $t = \log[\varepsilon]$. On a $B_{dR} = B_{dR}^+[1/t]$. On note A_{cris} le séparé complété pour la topologie p-adique de la sous-$W(R)$-algèbre de $W(R)[1/p]$ engendrée par les $\xi^m/m!$ pour $m \in \mathbb{N}$. Alors A_{cris} s'identifie à un sous-anneau de B_{dR}^+ contenant t et on pose $B_{cris}^+ = A_{cris}[1/p]$ et $B_{cris} = B_{cris}^+[1/t] \subset B_{dR}$. La série $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n+1}\xi^n/np^n$ converge dans B_{dR}^+ vers un élément $\log[\pi] = \log([\pi]/p)$ et on

[(1)] Voir [Fo88a] (resp. [Fo88b]) pour plus de détails sur la construction de B_{dR}, B_{cris} et B_{st} (resp. sur les représentations p-adiques de de Rham et potentiellement semi-stables).

note B_{st} la sous-B_{cris}-algèbre de B_{dR} engendrée par $\log[\pi]$. Pour tout $b \in R$ non nul, il existe $r, s \in \mathbb{Z}$, avec $s \geq 1$ et une unité a de R tels que $b^s = \pi^r a$ et on pose $\log[b] = (r \log[\pi] + \log[a])/s$. On a $B_{st} = B_{cris}[\log[b]]$ dès que b n'est pas une unité.

Soit $\mathcal{L}$ l'ensemble des extensions finies de K contenues dans $\overline{K}$. Pour tout $L \in \mathcal{L}$, on pose $G_L = \mathrm{Gal}(\overline{K}/L)$ et on note L_0 le corps des fractions de l'anneau des vecteurs de Witt à coefficients dans le corps résiduel de L. Le corps $\overline{K}$ se plonge de façon naturelle dans B_{dR}^+ et l'action de G_K s'étend de façon naturelle à B_{dR}, l'anneau B_{st} est stable par G_K. Pour tout $L \in \mathcal{L}$, on a $(B_{dR})^{G_L} = L$ tandis que $(B_{st})^{G_L} = L_0$ et l'application naturelle $L \otimes_{L_0} B_{st} \to B_{dR}$ est injective.

Pour toute représentation p-adique V de G_K de dimension finie h sur $\mathbb{Q}_p$, on pose $D_{dR}(V) = (\overline{K} \otimes_{\mathbb{Q}_p} V)^{G_K}$, $D_{st}(V) = (B_{st} \otimes_{\mathbb{Q}_p} V)^{G_K}$ et, si L est une extension finie de K contenue dans $\overline{K}$, $D_{st,L}(V) = (B_{st} \otimes_{\mathbb{Q}_p} V)^{G_L}$. On a $\dim_K D_{dR}(V) \leq h$ et on dit que V *est de de Rham* si on a l'égalité. C'est le cas si $\dim_{K_0} D_{st}(V) = h$ auquel cas on dit que V *est semi-stable*. C'est aussi le cas s'il existe $L \in \mathcal{L}$ tel que $\dim_{L_0} D_{st,L}(V) = h$, auquel cas on dit que V *est potentiellement semi-stable*, ou si l'on veut préciser L, que V *est L-semi-stable*.

Théorème B. — *Toute représentation p-adique de G_K qui est de de Rham est potentiellement semi-stable.*

Soit $\overline{K}B_{st}$ le plus petit sous-anneau de B_{dR} contenant $\overline{K}$ et B_{st}. Ce théorème revient à dire que, pour toute représentation de de Rham V, l'inclusion $((\overline{K}B_{st}) \otimes_{\mathbb{Q}_p} V)^{G_K} \subset (B_{dR} \otimes_{\mathbb{Q}_p} V)^{G_K}$ est une égalité. Berger [Be02] en a ramené la preuve à un résultat sur les équations différentielles p-adiques, résultat qui a ensuite été prouvé indépendamment par André [An02], Kedlaya [Ke02] et Mebkhout [Me02], voir §3.

L'un des intérêts de ce théorème est que l'on dispose d'une description algébrique *explicite* de la catégorie des représentations potentiellement semi-stables. Le Frobenius usuel sur $W(R)$ s'étend de façon naturelle en un endomorphisme φ de l'anneau B_{st} (on a $\varphi t = pt$ et $\varphi(\log[\pi]) = p \log[\pi]$). Il existe une unique B_{cris}-dérivation $N : B_{st} \to B_{st}$ telle que $N(\log[\pi]) = -1$. L'action de φ et de N commutent à celle de G_K et $N\varphi = p\varphi N$.

Soit $L \in \mathcal{L}$ telle que L/K est galoisienne. Pour toute représentation p-adique V de G_K, $D_{st,L}(V)$ est un $(\varphi, N, \mathrm{Gal}(L/K))$-*module filtré* de dimension finie, i.e. c'est un L_0-espace vectoriel D de dimension finie, muni

– de deux applications $\varphi : D \to D$, $N : D \to D$, la première semi-linéaire relativement à la restriction de φ à L_0 et bijective, la deuxième linéaire, vérifiant $N\varphi = p\varphi N$,

– d'une action semi-linéaire de $\mathrm{Gal}(L/K)$, commutant à φ et à N,

– d'une filtration indexée par $\mathbb{Z}$, décroissante, exhaustive et séparée, du K-espace vectoriel $D_K = (L \otimes_{L_0} D)^{\mathrm{Gal}(L/K)}$ (si $D = D_{st,L}(V)$, on a $D_K \subset (B_{dR} \otimes_{\mathbb{Q}_p} V)^{G_K}$ et, pour tout $i \in \mathbb{Z}$, $\mathrm{Fil}^i D_K = D_K \cap (B_{dR}^+ t^i \otimes_{\mathbb{Q}_p} V)^{G_K}$).

On pose $t_H(D) = \sum_{i \in \mathbb{Z}} i. \dim_K \mathrm{Fil}^i D_K / \mathrm{Fil}^{i+1} D_K$. Si $D = \oplus_{\alpha \in \mathbb{Q}} D_\alpha$ est la décomposition suivant les pentes du φ-isocristal sous-jacent, on pose aussi $t_N(D) = \sum_{\alpha \in \mathbb{Q}} \alpha. \dim_{L_0} D_\alpha$. On dit que D est *admissible* si

a) on a $t_H(D) = t_N(D)$,

b) pour tout sous-L_0-espace vectoriel D' de D, stable par φ, N et $\mathrm{Gal}(L/K)$, on a $t_H(D') \leq t_N(D')$ (on a muni $D'_K \subset D_K$ de la filtration induite).

THÉORÈME C [CF00]. — *Soit $L \subset \overline{K}$ une extension finie galoisienne de K.*

i) Pour toute représentation L-semi-stable V, $D_{st,L}(V)$ est admissible.

ii) Le foncteur qui à V associe $D_{st,L}(V)$ induit une équivalence[(2)] *entre la sous-catégorie pleine* $\mathrm{Rep}_{st,L}(G_K)$ *de* $\mathrm{Rep}_{\mathbb{Q}_p}(G_K)$ *dont les objets sont les représentations L-semi-stables et la catégorie des* $(\varphi, N, \mathrm{Gal}(L/K))$*-modules filtrés admissibles.*

Remarque. Il était jusqu'à présent d'usage [Fo88b] d'appeler *faiblement admissible* ce que nous appelons ici *admissible.* On savait (*loc.cit.*, th.5.6.7) que $D_{st,L}$ induit une équivalence entre la catégorie $\mathrm{Rep}_{st,L}(G_K)$ et une sous-catégorie pleine de la catégorie des modules filtrés (faiblement) admissibles ; on conjecturait que ce foncteur est essentiellement surjectif et c'est ce qui est prouvé dans [CF00].

2. Espaces de Banach-Colmez[(3)]

2.1. – Une *C-algèbre de Banach* est une C-algèbre normée complète A ; son *spectre maximal* est l'ensemble $\mathrm{Spm}_C A$ des sections continues $s : A \to C$ du morphisme structural. Si $f \in A$ et $s \in \mathrm{Spm}_C A$, on pose $f(s) = s(f)$. Une *C-algèbre spectrale* est une C-algèbre de Banach A telle que la norme est la norme spectrale, i.e. telle que, pour tout $f \in A$, $||f|| = sup_{s \in \mathrm{Spm}_C A} |f(s)|_p$; dans ce cas, $\mathrm{Spm}_C A$ est un espace métrique complet (la distance étant définie par $d(s_1, s_2) = \sup_{||f|| \leq 1} |f(s_1) - f(s_2)|_p$). Avec comme morphismes les homomorphismes continus de C-algèbres, les C-algèbres spectrales forment une catégorie. La *catégorie des variétés spectrales affines sur C* est la catégorie opposée.

Un *groupe spectral commutatif affine sur C* est un objet en groupes commutatifs dans la catégorie des variétés spectrales affines sur C. Ces groupes forment, de façon évidente, une catégorie additive qui a des limites projectives finies. Le foncteur qui à un groupe spectral commutatif affine associe le groupe topologique sous-jacent est fidèle. Si $\mathcal{S} = \mathrm{Spm}_C A$ est un groupe spectral commutatif affine, *un sous-groupe spectral* du groupe topologique sous-jacent est un sous-groupe $\mathcal{T}$ qui admet une structure de groupe spectral (nécessairement unique) telle que l'inclusion $\mathcal{T} \to \mathcal{S}$ est un morphisme de groupes spectraux.

Soit S un espace de Banach (p-adique) et $\mathcal{S}_0$ la boule unité. Un *réseau* de S est un sous-$\mathbb{Z}_p$-module $\mathcal{S}$ qui est tel que l'on peut trouver $r, s \in \mathbb{Z}$ vérifiant

(2) C'est même une équivalence de catégories tannakiennes, cf. [Fo88b].

(3) C'est en cherchant à prouver le théorème C que j'ai été conduit à m'intéresser aux presque C-représentations. C'est Colmez qui a compris que les propriétés dont j'avais besoin provenaient de structures analytiques. Cela nous a permis de prouver le théorème C. Colmez a ensuite étudié plus en détail ces structures analytiques [Co02]. Ce que je raconte ici est une interprétation, dans le langage de [Fo02], §4, de ces travaux de Colmez et devrait être développé dans [FP02].

$p^r\mathcal{S}_0 \subset \mathcal{S} \subset p^s\mathcal{S}_0$. Il revient au même de dire qu'il existe une norme équivalente à la norme donnée pour laquelle $\mathcal{S}$ est la boule unité.

Une *C-structure analytique sur S* est la donnée d'un C-groupe spectral commutatif affine $\mathcal{S}$ et d'un homomorphisme continu du groupe topologique sous-jacent à $\mathcal{S}$ dans S dont l'image est un réseau et le noyau un $\mathbb{Z}_p$-module de type fini. On dit que deux C-structures analytiques $\mathcal{S}$ et $\mathcal{T}$ sur S sont *équivalentes* si $\mathcal{S} \times_S \mathcal{T}$ est un sous-groupe spectral de $\mathcal{S} \times \mathcal{T}$. Un *(espace de) Banach analytique (sur C)* est la donnée d'un espace de Banach muni d'une classe d'équivalence de C-structures analytiques (on les appelle les structures *admissibles* de S). On dit que S est *effectif* s'il existe une structure admissible $\mathcal{S}$ telle que l'application $\mathcal{S} \to S$ est injective.

Un *morphisme de Banach analytiques* $f : S \to T$ est une application $\mathbb{Q}_p$-linéaire continue telle qu'il existe des structures admissibles $\mathcal{S}$ de S et $\mathcal{T}$ de T et un morphisme $\mathcal{S} \to \mathcal{T}$ qui induit f. Les Banach analytiques forment une catégorie additive $\mathcal{BA}_C$.

Si S est un Banach analytique et si V est un sous-$\mathbb{Q}_p$-espace vectoriel de dimension finie, le quotient S/V a une structure naturelle de Banach analytique. On dit que deux Banach analytiques S_1 et S_2 sont *presque isomorphes* s'il existe des sous-$\mathbb{Q}_p$-espaces vectoriels de dimension finie V_1 de S_1 et V_2 de S_2 et un isomorphisme $S_1/V_1 \to S_2/V_2$ (de Banach analytiques).

Le groupe sous-jacent à $\mathcal{O}_C$ a une structure naturelle de groupe spectral commutatif affine : on a $\mathcal{O}_C = \mathrm{Spm}_C C\{X\}$ où $C\{X\}$ est l'algèbre de Tate des séries formelles à coefficients dans C en l'indéterminée X dont le terme général tend vers 0. Ceci fait de C un espace de Banach analytique effectif. Un *Banach analytique vectoriel* est un Banach analytique isomorphe à C^d pour un entier d convenable. Un *espace de Banach-Colmez* est un *Banach analytique presque vectoriel*, i.e. un Banach analytique qui est presque isomorphe à un Banach analytique vectoriel. On note $\mathcal{BC}_C$ la sous-catégorie pleine de $\mathcal{BA}_C$ dont les objets sont les espaces de Banach-Colmez.

PROPOSITION (théorème de Colmez (4)). — *La catégorie $\mathcal{BC}_C$ est abélienne et le foncteur d'oubli de $\mathcal{BC}_C$ dans la catégorie des $\mathbb{Q}_p$-espaces vectoriels est exact et fidèle. Il existe sur les objets de $\mathcal{BC}_C$, une unique fonction additive $dh : S \mapsto (d(S), h(S)) \in \mathbb{N} \times \mathbb{Z}$ telle que $dh(C^d) = (d, 0)$ et $dh(V) = (0, \dim_{\mathbb{Q}_p} V)$ si V est de dimension finie sur $\mathbb{Q}_p$.*

2.2. – La meilleure façon de comprendre les théorèmes A et C c'est d'utiliser le résultat précédent pour les prouver (5). Lorsque k est fini, toute presque-C-représen-

(4) C'est à peu près le résultat principal de [Co02]. La définition donnée par Colmez de ce qu'il appelle les Espaces de Banach de dimension finie (avec un E majuscule) est légèrement différente. Il n'est pas très difficile de construire une équivalence entre sa catégorie et la nôtre [FP02].

(5) C'est ainsi que Colmez redémontre le théorème C dans [Co02]. Moyennant une preuve un peu plus compliquée, on peut n'utiliser qu'un résultat d'analyticité apparemment moins fort ; c'est ce qu'on fait pour prouver le théorème C dans [CF00] et le théorème A dans [Fo02].

tation est munie d'unee structure naturelle d'espace de Banach-Colmez ; toute application $\mathbb{Q}_p$-linéaire continue G_K-équivariante d'une presque C-représentation dans une autre est analytique. Le fait que $\mathcal{C}(G_K)$ est abélienne et l'existence de la fonction dh résultent alors du théorème de Colmez.

Le principe de la preuve du théorème C est le suivant : On se ramène facilement au cas semi-stable, i.e. au cas où $L = K$. Il s'agit de vérifier que, si D est un (φ, N)-module filtré (faiblement) admissible de dimension h, il existe une représentation p-adique V de dimension h telle que $D_{st,K}(V)$ soit isomorphe à D. Une torsion à la Tate permet de supposer que $\mathrm{Fil}^0 D_K = D_K$. Notons $V_{st}^{+,0}(D)$ le $\mathbb{Q}_p$-espace vectoriel des applications K_0-linéaires de D dans $B_{st} \cap B_{dR}^+$ qui commutent à l'action de φ et de N et $V_{st}^{+,1}$ le quotient du K-espace vectoriel des applications K-linéaires de D_K dans B_{dR}^+ par le sous-espace des applications qui sont compatibles avec la filtration. On commence par vérifier que le noyau $V_{st}^*(D)$ de l'application évidente $\beta : V_{st}^{+,0}(D) \to V_{st}^{+,1}(D)$ est un $\mathbb{Q}_p$-espace vectoriel de dimension finie $\leq h$ et que, s'il est de dimension h, alors la représentation duale $V_{st}(D)$ est semi-stable et D est isomorphe à $D_{st}(V_{st}(D))$. La théorie des espaces de Banach analytiques permet de munir $V_{st}^{+,0}(D)$ et $V_{st}^{+,1}(D)$ d'une structure d'espace de Banach-Colmez et on a $dh(V_{st}^{+,0}(D)) = (t_N(D), h)$ tandis que $dh(V_{st}^{+,1}(D)) = (t_H(D), 0)$. Il suffit alors de vérifier que l'application β est analytique. Comme $t_H(D) = t_N(D)$, l'additivité de dh implique que β est surjective et que $dh(V_{st}^*(D)) = (0, h)$, ce qui signifie bien que $\dim_{\mathbb{Q}_p} V_{st}^*(D) = h$.

3. Equations différentielles

3.1. – Soit A un anneau commutatif et $d : A \to \Omega_A$ une dérivation de A dans un A-module Ω_A. Ici, un A-module à connexion (sous-entendu relativement à d) est un A-module libre de rang fini $\mathcal{D}$ muni d'une application $\nabla : \mathcal{D} \to \mathcal{D} \otimes \Omega_A$ vérifiant la règle de Leibniz. On dit que ce module est *trivial* s'il est engendré par le sous-groupe $\mathcal{D}_{\nabla=0}$ des *sections horizontales*.

Pour tout corps L de caractéristique 0, complet pour une valuation discrète, notons (cf. par exemple [Ts98], §2) $\mathcal{R}_{x,L}$ l'*anneau de Robba de L* (ou ''anneau des fonctions analytiques sur une couronne d'épaisseur nulle"), c'est-à-dire l'anneau des séries $\sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n x^n$ à coefficients dans L vérifiant

$\forall s < 1, |a_n|s^n \mapsto 0$ si $n \mapsto +\infty$ et $\exists r < 1$ tel que $|a_n|r^n \mapsto 0$ si $n \mapsto -\infty$.

Le sous-anneau $\mathcal{E}_{x,L}^\dagger$ de $\mathcal{R}_{x,L}$ des fonctions $\sum a_n x^n$ telles que les a_n sont bornés est un corps muni d'une valuation discrète (définie par $|\sum a_n x^n| = \sup|a_n|$) qui n'est pas complet mais est hensélien. Son corps résiduel s'identifie au corps des séries formelles $E = k_L((x))$ où k_L désigne le corps résiduel de L. Pour toute extension finie séparable F de E, il existe une, unique à isomorphisme unique près, extension non ramifiée $\mathcal{E}_F^\dagger$ de $\mathcal{E}_{x,L}^\dagger$ de corps résiduel F . Posons $\mathcal{R}_F = \mathcal{R}_{x,L} \otimes_{\mathcal{E}_{x,L}^\dagger} \mathcal{E}_F^\dagger$. Si k_F désigne le corps résiduel de F, L' l'unique extension non ramifiée de L de corps résiduel k_F et si x' est un relèvement dans l'anneau des entiers de $\mathcal{E}_F^\dagger$ d'une

uniformisante de F, l'anneau $\mathcal{R}_F$ s'identifie à l'anneau de Robba $\mathcal{R}_{x',L'}$.

Notons $\Omega^1_{\mathcal{R}_{x,L}}$ le $\mathcal{R}_{x,L}$-module libre de rang 1 de base dx, solution du problème universel pour les dérivations continues en un sens évident. Les modules à connexion sur l'anneau $\mathcal{R}_{x,L}$ forment une catégorie artinienne. Si $\mathcal{D}$ est un objet de cette catégorie, on dit qu'il est *unipotent* si son semi-simplifié est trivial. On dit qu'il est *quasi-unipotent* s'il existe une extension finie séparable F de $k((X))$ telle que le module à connexion sur $\mathcal{R}_F$ déduit de $\mathcal{D}$ par extension des scalaires soit unipotent.

Pour tout z dans l'aneeau des entiers de $\mathcal{E}^\dagger_{x,K_0}$, il existe un unique endomorphisme continu φ de $\mathcal{R}_{x,K_0}$ qui prolonge le Frobenius absolu sur K_0 et vérifie $\varphi(x) = x^p + pz$; on appelle *Frobenius* un tel endomorphisme. Pour un tel φ, on note encore $\varphi : \Omega^1_{\mathcal{R}_{x,K_0}} \to \Omega^1_{\mathcal{R}_{x,K_0}}$ l'application induite. Soit $\mathcal{D}$ un module à connexion sur $\mathcal{R}_{x,K_0}$. Une *structure de Frobenius sur* $\mathcal{D}$ consiste en la donnée d'un Frobenius φ sur $\mathcal{R}_{x,K_0}$ et d'une application φ-semi-linéaire $\varphi_{\mathcal{D}} : \mathcal{D} \to \mathcal{D}$ commutant à ∇.

Théorème (André, Kedlaya, Mebkhout [(6)]). — *Tout module à connexion sur* $\mathcal{R}_{x,K_0}$ *qui admet une structure de Frobenius est quasi-unipotent.*

Avant de montrer comment Berger [Be2] déduit le théorème B de cet énoncé, rappelons quelques résultats de [Fo00], [Fo90] et [CC98] (cf. aussi [Co98]). Dans tout ce qui suit, V est une représentation p-adique de G_K de dimension finie h.

3.2. – Soit K_∞ le sous-corps de $\overline{K}$ engendré sur K par les racines de l'unité d'ordre une puissance de p. Posons $H_K = \mathrm{Gal}(\overline{K}/K_\infty)$ et $\Gamma_K = G_K/H_K$. En utilisant la théorie de Sen [Se80], on montre [Fo00] que l'union $\Delta_{dR}(V)$ des sous-$K_\infty[[t]]$-modules de type fini de $(B_{dR} \otimes_{\mathbb{Q}_p} V)^{H_K}$ stables par Γ_K est un $K_\infty((t))$-espace vectoriel de dimension h et qu'il existe une unique connexion

$$\nabla : \Delta_{dR}(V) \to \Delta_{dR}(V) \otimes dt/t$$

qui a la propriété que, pour tout sous-$K_\infty[[t]]$-module de type fini Y stable par G_K, tout entier $r \geq 0$ et tout $y \in Y$, il existe un sous-groupe ouvert $\Gamma_{r,y}$ de Γ tel que, si $\nabla(y) = \nabla_0(y) \otimes dt/t$, alors

$$\gamma(y) \equiv \exp(\log \chi(\gamma).\nabla_0)(y) \pmod{t^r Y}, \text{ pour tout } \gamma \in \Gamma_{r,y}.$$

Cette connexion est *régulière* : le $K_\infty[[t]]$-module $\Delta^+_{dR}(V) = (B^+_{dR} \otimes V) \cap \Delta_{dR}(V)$ est un réseau de $\Delta_{dR}(V)$ vérifiant $\nabla(\Delta^+_{dR}(V)) \subset \Delta^+_{dR}(V) \otimes dt/t$. On a $D_{dR}(V) = (\Delta_{dR}(V))^{\Gamma_K}$. L'action de Γ_K est discrète sur $\Delta_{dR}(V)_{\nabla=0}$; on en déduit que $\Delta_{dR}(V)_{\nabla=0} = K_\infty \otimes_K D_{dR}(V)$ donc que V est de de Rham si et seulement si le module à connexion $\Delta_{dR}(V)$ est trivial. Ceci se produit si et seulement s'il existe un réseau (nécessairement unique) $\Delta^0_{dR}(V)$ de $\Delta_{dR}(V)$ vérifiant $\nabla(\Delta^0_{dR}(V)) \subset \Delta^0_{dR}(V) \otimes dt$.

(6) Crew [Cr98] a suggéré que ce théorème pouvait être vrai ; il a été prouvé indépendamment par André [An02], Mebkhout [Me02] et Kedlaya [Ke01]. Pour André comme pour Mebkhout, c'est un cas particulier d'un résultat plus général dont la preuve repose sur la théorie de Christol-Mebkhout [CM]. La preuve de Kedlaya est plus directe : elle utilise une classification à la Dieudonné-Manin des modules munis d'un Frobenius pour se ramener à un résultat de Tsuzuki [Ts98]. Voir [Co01] pour une étude comparative plus détaillée.

3.3. – Rappelons brièvement la théorie des (φ, Γ)-modules [Fo80]. Soit $\mathcal{O}_{\mathcal{E}_0}$ l'adhérence dans $W(FR)$ de la sous-$W(k)$-algèbre engendrée par $[\varepsilon]$ et $1/([\varepsilon]-1)$. C'est un anneau de valuation discrète complet dont l'idéal maximal est engendré par p et dont le corps résiduel E_0 est le corps des séries formelles $k((\varepsilon-1))$ vu comme sous-corps fermé de FR. Notons $\mathcal{O}_{\widehat{\mathcal{E}^{nr}}}$ le séparé complété pour la topologie p-adique de l'union de toutes les sous-$\mathcal{O}_{\mathcal{E}_0}$-algèbres finies étales de $\mathcal{O}_{\mathcal{E}_0}$ contenues dans $W(FR)$. C'est un anneau de valuation discrète complet dont le corps résiduel est une clôture séparable E^s de E_0. Son corps des fractions $\widehat{\mathcal{E}}^{nr}$ s'identifie à un sous-corps fermé du corps $\widetilde{B} = W(FR)[1/p]$, stable par l'action de G_K et par le Frobenius φ. Le corps $\mathcal{E}_K = (\widehat{\mathcal{E}}^{nr})^{H_K}$ est une extension finie non ramifiée du corps des fractions de $\mathcal{O}_{\mathcal{E}_0}$. Son corps résiduel E_K est une extension finie séparable de E_0 ; le corps résiduel k' de E_K est celui de K_∞.

Alors, $D(V) = (\widehat{\mathcal{E}}^{nr} \otimes_{\mathbb{Q}_p} V)^{H_K}$ est un (φ, Γ_K)-*module sur* $\mathcal{E}_K$, i.e. un $\mathcal{E}_K$-espace vectoriel de dimension finie D muni d'un Frobenius φ-semi-linéaire (que l'on note encore φ) et d'une action semi-linéaire continue de Γ_K commutant à l'action de φ ; ce (φ, Γ_K)-module est *étale*, i.e. il existe un $\mathcal{O}_{\mathcal{E}_K}$-réseau $\mathcal{D}$ de D tel que $\mathcal{D}$ est le $\mathcal{O}_{\mathcal{E}_K}$-module engendré par $\varphi(\mathcal{D})$. La correspondance $V \mapsto D(V)$ définit une équivalence entre $\mathrm{Rep}_{\mathbb{Q}_p}(G_K)$ et la catégorie des (φ, Γ_K)-modules étales.

3.4. – Il n'y a pas de flèche naturelle de $\widehat{\mathcal{E}}^{nr}$ dans B_{dR}^+, ce qui fait que la comparaison entre $\Delta_{dR}(V)$ et $D(V)$ n'est pas si facile. Toutefois, si $a \in R$ est non nul, $[a] \in W(R) \subset B_{dR}^+$ est inversible dans B_{dR}^+, ce qui permet de voir $1/[a] = [1/a]$ comme un élément de B_{dR}^+. Tout élément de $\widetilde{B}$ s'écrit d'une manière et d'une seule sous la forme $\sum_{n \gg -\infty} p^n [a_n]$, avec les $a_n \in FR$; notons $\widetilde{B}_{dR}^+$ le sous-anneau de $\widetilde{B}$ formé des séries de ce type qui convergent dans B_{dR}^+. L'application $\widetilde{B}_{dR}^+ \to B_{dR}^+$ est injective et permet d'identifier $\widetilde{B}_{dR}^+$ à une sous-$W(R)[1/p]$-algèbre de B_{dR}^+. Pour tout $r \in \mathbb{N}$, posons $\widehat{\mathcal{E}}_r^{nr,\dagger} = \widehat{\mathcal{E}}^{nr} \cap \varphi^r(\widetilde{B}_{dR}^+)$ et, pour tout $b \in \widehat{\mathcal{E}}_r^{nr,\dagger}$, notons $\varphi_r(b)$ l'unique $c \in \widetilde{B}_{dR}^+ \subset B_{dR}^+$ tel que $\varphi^r(c) = b$. On a $\widehat{\mathcal{E}}_r^{nr,\dagger} \subset \widehat{\mathcal{E}}_{r+1}^{nr,\dagger}$; soit $\widehat{\mathcal{E}}^{nr,\dagger}$ l'union des $\widehat{\mathcal{E}}_r^{nr,\dagger}$. Alors $\mathcal{E}_K^\dagger = (\widehat{\mathcal{E}}^{nr,\dagger})^{H_K}$ est un sous-corps dense de $\mathcal{E}_K$ stable par φ. On pose $D^\dagger(V) = (\widehat{\mathcal{E}}^{nr,\dagger} \otimes_{\mathbb{Q}_p} V)^{H_K}$. On peut le calculer à partir de $D(V)$: c'est l'union des sous-$\mathcal{E}_K^\dagger$-espaces vectoriels de dimension finie de $D(V)$ stables par φ. Le résultat principal de [CC98] est que V est surconvergente, c'est-à-dire que l'application naturelle $\mathcal{E}_K \otimes D^\dagger(V) \to D(V)$ est un isomorphisme.

Pour tout $r \in \mathbb{N}$, soit $\mathcal{E}_{K,r}^\dagger = (\widehat{\mathcal{E}}_r^{nr,\dagger})^{H_K}$. Alors $D_r^\dagger(V) = (\widehat{\mathcal{E}}_r^{nr,\dagger} \otimes_{\mathbb{Q}_p} V)^{H_K}$ est aussi le plus grand sous-$\mathcal{E}_{K,r}^\dagger$-module M de type fini de $D(V)$ tel que $\varphi(M) \subset \mathcal{E}_{K,r+1}^\dagger M$. Pour r assez grand, l'application naturelle $\mathcal{E}_K^\dagger \otimes_{\mathcal{E}_{K,r}^\dagger} D_r^\dagger(V) \to D^\dagger(V)$ est un isomorphisme. Lorsqu'il en est ainsi, on a $\varphi_r(\mathcal{E}_{K,r}^\dagger) \subset K_\infty[[t]]$ et

$$\Delta_{dR}(V) = K_\infty((t)) \otimes_{\mathcal{E}_{K,r}^\dagger} D_r^\dagger(V) \text{ et donc } D_{dR}(V) = (K_\infty((t)) \otimes_{\mathcal{E}_{K,r}^\dagger} D_r^\dagger(V))^{\Gamma_K}.$$

3.5. – Wach [Wa96] a montré comment calculer $D_{st}(V)$ à partir de $D^\dagger(V)$ lorsque

V est *de hauteur finie*. C'est Berger [Be02] qui a compris comment traiter le cas général : Choisissons un relèvement x dans l'anneau des entiers de $\mathcal{E}_K^\dagger$ d'une uniformisante de E_K. Si K'_0 désigne le corps des fractions de $W(k')$, $\mathcal{E}_K^\dagger$ s'identifie précisément au sous-anneau $\mathcal{E}^\dagger_{x,K'_0}$ de l'anneau de Robba $\mathcal{R}_{x,K'_0}$. Ce dernier ne dépend pas du choix de x et nous le notons $\mathcal{E}_K^{rig}$; il contient $t = \log[\varepsilon]$. Si L est une extension finie de K contenue dans $\overline{K}$, le corps $F = (E^s)^{\mathrm{Gal}(\overline{K}/LK_\infty)}$ est une extension finie de E_K et l'anneau $\mathcal{E}_L^{rig}$ s'identifie à l'anneau noté $\mathcal{R}_F$ au §3.1.

Rappelons (§1.2) que si $u = \log[\varepsilon - 1]$, on a $B_{st} = B_{cris}[u]$. Les actions de φ et de Γ_K s'étendent de façon évidente à $\mathcal{E}_K^{rig}$, à $\mathcal{E}_K^{rig}[1/t]$ et à l'anneau $\mathcal{E}_K^{rig}[1/t][u]$ des polynômes en u à coefficients dans $\mathcal{E}_K^{rig}[1/t]$. Berger montre que

$$D_{cris}(V) = (\mathcal{E}_K^{rig}[1/t] \otimes_{\mathcal{E}_K^\dagger} D^\dagger(V))^{\Gamma_K} \text{ et } D_{st}(V) = (\mathcal{E}_K^{rig}[1/t][u] \otimes_{\mathcal{E}_K^\dagger} D^\dagger(V))^{\Gamma_K}$$

(l'action de N sur $D_{st}(V)$ est la restriction de $-d/du \otimes id_{D^\dagger(V)}$).

3.6. – Posons $D = D_K^{rig}(V) = \mathcal{E}_K^{rig}[1/t] \otimes_{\mathcal{E}_K^\dagger} D^\dagger(V)$. En utilisant l'action de Γ_K comme au §3.4, on définit une connexion $\nabla : D \to D \otimes dt/t$ qui commute à l'action de φ. Cette connexion est *régulière* au sens qu'il existe un sous-$\mathcal{E}_K^{rig}$-module D^+ de D, libre de rang h, stable par φ et vérifiant $\nabla(D^+) \subset D^+ \otimes dt/t$ (prendre $D^+ = \mathcal{E}_K^{rig} \otimes_{\mathcal{E}_K^\dagger} D^\dagger(V)$). On vérifie que le $\mathcal{E}_K^{rig}$-module libre $\Omega^1_{\mathcal{E}_K^{rig}}$ admet $d[\varepsilon]$ comme base. Mais $dt/t = [\varepsilon]^{-1}/td[\varepsilon]$ et t n'est pas inversible dans $\mathcal{E}_K^{rig}$. On déduit alors facilement du théorème d'André-Kedlaya-Mebkhout que V est potentiellement semi-stable si et seulement s'il existe un sous-$\mathcal{E}_K^{rig}$-module libre D^0 de D, libre de rang h, stable par φ et vérifiant $\nabla(D^0) \subset D^0 \otimes dt$.

Il ne reste plus qu'à construire un tel D^0 lorsque V est de de Rham. Fixons un entier $r_0 \geq 1$ suffisamment grand pour que $D^\dagger_{r_0}(V)$ contienne une base de $D^\dagger(V)$ sur $\mathcal{E}_K^\dagger$ et pour que $x \in \mathcal{E}^\dagger_{r_0}$. Pour tout $r \geq r_0$ le sous-anneau $\mathcal{E}_{K,r}^{rig}$ de $\mathcal{E}_K^{rig} = \mathcal{R}_{x,K'_0}$ formé des $\sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n x^n$ vérifiant

$$\forall s < 1, |a_n|s^n \mapsto 0 \text{ si } n \mapsto +\infty \text{ et } a_n(\varepsilon^r - 1)^n \mapsto 0 \text{ si } n \mapsto -\infty$$

est stable par Γ_K et contient $\mathcal{E}^\dagger_{K,r}$. Si $D_r = D_{K,r}^{rig}(V) = \mathcal{E}_{K,r}^{rig} \otimes_{\mathcal{E}^\dagger_{K,r}} D_r^\dagger(V)$, alors D est la réunion croissante des D_r et $\varphi(D_r) \subset D_{r+1}$. L'application φ_r induit un homomorphisme de $\mathcal{E}_{K,r}^{rig}$ dans $K_\infty((t))$ et un isomorphisme de $K_\infty((t)) \otimes_{\mathcal{E}_{K,r}^{rig}} D_r$ sur $\Delta_{dR}(V)$. L'application $\Phi_r : D_r \to \Delta_{dR}(V)$ qui envoie a sur $1 \otimes a$ est injective.

Soit $\Delta^0_{dR}(V)$ le sous-$K_\infty((t))$-module de $\Delta_{dR}(V)$ engendré par les sections horizontales. Pour tout $r \geq r_0$, soit $D_r^0 = \{a \in D_r \mid \Phi_s(a) \in \Delta^0_{dR}(V) \text{ pour tout } s \geq r\}$. On a $D_r^0 \subset D_{r+1}^0$ et $D^0 = \cup_{r \geq r_0} D_r^0$ est un sous-$\mathcal{E}_K^{rig}$-module de D, stable par φ et vérifiant $\nabla(D^0) \subset D^0 \otimes dt$. Si V est de de Rham on déduit du fait que $\Delta^0_{dR}(V)$ est un réseau de $\Delta_{dR}(V)$ que D^0 est libre de rang h sur $\mathcal{E}_K^{rig}$. D'où le théorème B.

Bibliographie

[An02] Y. André, *Filtration de type Hasse-Arf et monodromie p-adique*, Inv. Math. **148** (2002), 285–317.

[Be02] L. Berger, *Représentations p-adiques et équations différentielles*, Inv. Math. **148** (2002), 219-284.

[CM] G. Christol et Z. Mebkhout, *Sur le théorème de l'indice des équations différentielles p-adiques* I, Ann. Inst. Fourier **43** (1993), 1545–1574 ; II, Ann. of Maths. **146** (1997), 345–410 ; III, Ann. of Maths. **151** (2000), 385–457 ; IV, Inv. Math. **143** (2001), 629–671.

[Co98] P. Colmez *Représentations p-adiques d'un corps local* in Proceedings of the I.C.M. Berlin, vol. II, Documenta Mathematica (1998), 153–162.

[Co01] P. Colmez, *Les conjectures de monodromie p-adique*, Sém. Bourbaki, exp. 897, novembre 2001.

[Co02] P. Colmez, *Espaces de Banach de dimension finie*, J. Inst. Math. Jussieu, à paraître.

[CC98] F. Cherbonnier et P. Colmez, *Représentations p-adiques surconvergentes*, Inv. Math. **133** (1998), 581–611.

[CF00] P. Colmez et J.-M. Fontaine, *Construction des représentations semi-stables*, Inv. Math. **140** (2000), 1–43.

[Cr98] R. Crew, *Finiteness theorems for the cohomology of an overconvergent isocrystal on a curve*, Ann. scient. E.N.S. **31** (1998), 717–763.

[Fo83] J.-M. Fontaine, *Représentations p-adiques*, in Proceedings of the I.C.M., Warszawa, vol. I, Elsevier, Amsterdam (1984), 475–486.

[Fo88a] J.-M. Fontaine, *Le corps des périodes p-adiques*, avec un appendice par Pierre Colmez, in Périodes p-adiques, Astérisque **223**, S.M.F., Paris (1994), 59–111.

[Fo88b] J.-M. Fontaine, *Représentations p-adiques semi-stables*, in Périodes p-adiques, Astérisque **223**, S.M.F., Paris (1994), 113–184.

[Fo90] J.-M. Fontaine, *Représentations p-adiques des corps locaux*, in the Grothendieck Festschrift, vol II, Birkhäuser, Boston (1990), 249–309).

[Fo00] J.-M. Fontaine, *Arithmétique des représentations galoisiennes p-adiques*, prépublication, Orsay 2000-24. A paraître dans Astérisque.

[Fo02] J.-M. Fontaine, *Presque-$\mathbb{C}_p$-représentations*, prépublication, Orsay 2002-12.

[FP02] J.-M. Fontaine et Jérôme Plût, *Espaces de Banach-Colmez*, en préparation.

[Ke02] K. Kedlaya, *A p-adic local monodromy theorem*, preprint, Berkeley (2001).

[Me02] Z. Mebkhout, *Analogue p-adique du théorème de Turrittin et le théorème de la monodromie p-adique*, Inv. Math. **148** (2002), 319–351.

[Sen80] S.Sen, Continuous Cohomology and p-adic Galois Representations, Inv. Math. **62** (1980), 89–116.

[Ts98] N. Tsuzuki, *Slope filtration of quasi-unipotent overconvergent F-isocrystals*, Ann. Inst. Fourier **48** (1998), 379–412.

[Wa96] N. Wach, *Représentations p-adiques potentiellement cristallines*, Bull. S.M.F. **124** (1996), 375–400.